



ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І СТРУКТУРА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ СУБХРОНІЧНОЇ ДІЇ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОВОЧІВНИЦТВІ

(Ілюстрації до статті, вміщеної на сторінках 16-21)






Рисунок 2
Печінка щура, що одержував протягом 90 днів суміш Квадрісу та Хлороксиду міді. Білкова та жирова дистрофія гепатоцитів, особливо у ділянці портальних трактів. (Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення: 200)



а
Жирова дистрофія гепатоцитів




б
Осередкова круглоклітинна інфільтрація перипортальної сполучної тканини


Рисунок 3

Печінка щура, що одержував протягом 90 днів суміш Квадрісу та Актелліку. (Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення: 200)

Печінка щура, що одержував протягом 90 днів суміш Ридомілу Голд і Актелліку. (Фарбування за ван Гізоном. Збільшення: 200)



а
Помірне огрубіння перипортальної сполучної тканини



б
Нерівномірне потовщення базальної мембрани центральної вени

Рисунок 6

Печінка щура, що протягом 90 днів одержував суміш Ридомілу Голд і Карате Зеону. Зерниста дистрофія гепатоцитів. Гіперплазія жовчних проток. Некроз поодиноких гепатоцитів. (Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення: 200)






Рисунок 5
Печінка щура, що одержував протягом 90 днів суміш Ридомілу Голд і Топазу. Дрібні некрози гепатоцитів. (Фарбування гематоксиліном і еозином. Збільшення: 200)



ФОСФОРНА АВАРІЯ: МОЖЛИВА ТОКСИКОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДОЙМ

(Ілюстрації до статті, вміщеної на сторінках 16-21)



Місце аварії



Точка відбору проби

Точки відбору проб води на гідрогеологічній карті

Рисунок 2